

Pianta Officinale	Interazione - Farmaco
AGLIO	ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI, ANTICOAGULANTI e ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI aumenta la gastrolesivita' e il rischio di emorragia
ALOE GEL	ANTIDIABETICI ORALI aumenta l'efficacia del farmaco
ARANCIO AMARO	STIMOLANTI DEL SISTEMA NERVOSO SIMPATICO, PSICOFARMACI, CAFFEINA e TIROXINA, provocano rischi di rialzi di pressione, accelerazione del battito cardiaco, tremori, insonnia
ARTIGLIO DEL DIAVOLO	WARFARIN provoca porpora
BIANCOSPINO	DIGITALE aumenta la biodisponibilita' di farmaci, l'efficacia e la tossicita'
CAFFE', THE	TIROXINA, ERGOTAMINA, LITIO, ACIDO GUARANA' ACETILSALICILICO ANTICOAGULANTI aumenta la tossicita', da' assorbimento e riduce l'efficacia
GLYCYRRHIZA GLABRA	CORTISONICI, DIGITALE e DIURETICI aumenta la tossicita' del farmaco

Pianta Officinale	Interazione - Farmaco
PEPERONCINO	ACE INIBITORI (inibitori dell'angiotensina II) provocano tosse, con TEOFILLINA maggiore assorbimento e biodisponibilità del farmaco
PILOSELLA, ZEA MAIS, BETULLA	DIGITALE e DIURETICI aumenta il rischio di tossicità del farmaco e il calo del potassio nel sangue
SALICE	ACIDO ACETILSALICILICO e derivati aumenta il rischio di emorragie e gastrolesività
SENNA CASCARA	DIGITALE, DIURETICI e FARMACI VARI provoca abbassamento del potassio nel sangue e ridotto assorbimento intestinale
VALERIANA	ALCOOL, riduce l'effetto avverso dell'alcool
YOHIMBEE	ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI e TIROXINA provoca il rialzo di pressione, l'accelerazione del battito cardiaco, tremori
UVA URSINA	ACIDIFICANTI URINARI provoca l'inefficacia

Pianta Officinale	Interazione - Farmaco
GINKGO BILOBA	PARACETAMOLO, ERGOTINA, con DIURETICI TIAZIDICI può dare fenomeni di ipertensione, ANTICOAGULANTI e ACIDO
IPERICO	PSICOFARMACI e ANTICONCEZIONALI provoca interazioni
PAPAIA	WARFARIN aumenta l'INR
FIBRE	ANTICOAGULANTI, ANTIDIABETICI, riducono l'assorbimento e l'efficacia
L' Acetosa e l' Acetosella	sono sconsigliate a chi soffre di disturbi gastrici e patologie epatiche, a causa del loro contenuto in ossalato di calcio; sono anche sconsigliate a chi soffre di nefrolitiasi da ossalato di calcio
Achillea	Può causare reazioni allergiche in soggetti sensibili alle Composite; se usata eccessivamente, può provocare reazioni cutanee dovute ai raggi solari
Alloro	può causare allergie o dermatiti da contatto in cuochi, dentisti e operatori del settore farmaceutico.